

LE FRELON ASIATIQUE EN 2025

CHIFFRES CLÉS

Le frelon asiatique se propage rapidement en France et menace à la fois nos abeilles et la sécurité des habitants. Chaque nid peut détruire des ruches entières et représenter un vrai danger pour les personnes allergiques.

Chaque colonie produit jusqu'à **20 reines au printemps** et peut consommer **13 kg d'insectes par saison**, réduisant fortement les populations d'abeilles et perturbant l'écosystème local.



Chaque frelon peut tuer jusqu'à **50 abeilles** par jour



Jusqu'à **2000 frelons** par nids



500 000 nids à frelons en France



Les pertes pour l'apiculture atteignent **près de 12 millions d'euros**.

RECONNAÎTRE UN FRELON

Voici comment identifier les frelons parmi les autres insectes.

Le frelon asiatique

Le frelon asiatique à pattes jaunes (*Vespa velutina*) se distingue par sa couleur majoritairement noire, une large bande orangée sur l'abdomen et un fin liseré jaune sur le premier segment. Sa tête, vue de face, est orange, tandis que les extrémités de ses pattes sont jaunes. Sa taille varie entre 17 et 32 mm.

Le nid du frelon asiatique est de forme sphérique à piriforme, avec de petites ouvertures situées sur les côtés. On le trouve généralement à plus de 10 mètres de hauteur, dans les arbres, les haies ou parfois dans les bâtiments.



Le frelon d'europe

Le *Vespa crabro*, a l'abdomen à dominante jaune clair, avec des bandes noires. Sa tête est jaune de face et rouge au dessus. Son thorax et ses pattes sont noirs et brun-rouges. Les ouvrières mesurent entre 18 et 23 mm et les reines entre 25 et 35.


Son nid a une forme cylindrique, avec de larges ouvertures orientées vers le bas. Il est généralement installé dans des arbres creux ou des cheminées, et il est rarement construit en hauteur.



Vue du dessous

CYCLE DU FRELON

Pour mieux comprendre le frelon asiatique, voici un schéma récapitulatif illustrant son cycle de vie.



PÉRIODE IDÉALE DE PIÉGEAGE

LE PIÉGEAGE AU PRINTEMPS



Piéger au printemps constitue une action essentielle pour limiter la prolifération des frelons.

À cette période de l'année, les fondatrices sortent de leur hibernation pour créer de nouveaux nids. En les capturant avant qu'elles ne commencent à se reproduire, on réduit considérablement le nombre de colonies susceptibles de se développer durant l'été. Cette diminution du nombre de nids entraîne, par conséquent, une baisse significative de la pression exercée sur les abeilles et autres insectes pollinisateurs à l'automne.



Le piégeage doit être ciblé pour éviter de capturer d'autres espèces. Les pièges seront placés près des ruchers, des anciens nids ou sur les axes de passage des frelons asiatiques.

LE PIÉGEAGE D'AUTOMNE



À cette période de l'année, la pression exercée par les frelons sur les colonies d'abeilles devient particulièrement importante, car ils recherchent activement des sources de nourriture riches en sucres. Un piégeage intensif et coordonné est alors essentiel pour limiter leur présence autour des ruchers. Cette action permet de protéger efficacement les colonies, souvent fragilisées par les attaques répétées, et de prévenir leur affaiblissement voire leur dépeuplement progressif.