

Que faire si vous découvrez un nid de frelons asiatiques lorsque les feuilles des arbres tombent ?

Depuis quelques semaines, les arbres se parent de leur robe automnale. Que faire si vous découvrez un nid de frelons asiatiques ?



Sitôt qu'il fait froid, les frelons sont engourdis et l'ensemble de la colonie meurt. (Illustration : ©Pixabay)

Par [Briac Trébert](#)

Publié le 4 déc. 2022 à 10h35

Les frelons asiatiques sont-ils présents dans leur nid pendant l'hiver ?
[Alors que les températures baissent](#) (enfin), faut-il s'inquiéter si vous découvrez (car les feuilles sont tombées des arbres) un nid près de chez vous ?

Le *Vespa velutina nigrithorax* est désormais une espèce invasive, et a colonisé presque toute la France. Difficile d'y échapper. Mais si en ce début décembre, le sérieux rafraîchissement de l'air déplume les arbres et laisse apparaître au grand jour des nids, sachez qu'ils sont désormais généralement **inoffensifs**.

Sitôt qu'il fait froid, les frelons sont engourdis et l'ensemble de la colonie meurt. Seule la reine va subsister et va passer l'hiver sous une tuile ou dans le sol, cachée quelque part. Si elle ne meurt pas pendant l'hiver, elle ressortira au printemps prochain et fabriquera un autre nid, à un autre endroit.

À lire aussi

Frelon asiatique en Bretagne : le cri de détresse d'un apiculteur

« Les oiseaux vont venir manger les larves qui auraient pu survivre »

À la fin de l'automne ou en hiver, les nids de frelons asiatiques ne sont donc en général pas traités pour la simple raison qu'ils sont vides. Les nids vont se détruire d'eux-mêmes avec les intempéries, et « les oiseaux, qui vont venir manger les larves qui auraient pu survivre », explique à *actu.fr* Guillaume Castagné, patron de l'entreprise « Allô frelons », « spécialiste de la destruction des nids d'hyménoptères ».

« En début de saison, aux premiers beaux jours, quand l'air commence à se réchauffer, les femelles fécondées, appelées gynés, commencent à sortir de leur hibernation. C'est à ce moment-là qu'elles se regroupent en petits paquets (de 2 à 15 individus environ). Elles commencent à fabriquer un petit nid primaire, de la taille d'une orange ou d'un petit melon », détaille-t-il.

“En fin d’automne, le nid atteint son apogée.

Mesurant souvent plus de 50cm de diamètre pour 60cm de haut, le nid reste très actif jusqu’au début de l’hiver

Guillaume Castagné

Allô frelons

« Quand les températures baissent, les femelles fécondées commencent à quitter le nid. Cela dure pendant plusieurs semaines et l’amplitude de cette période dépend de la météo (surtout des températures). Elles vont se mettre en dormance, à l’abri du froid (dans un tronc creux, un trou dans la terre, un tas de feuilles mortes, un grenier, une paire de gants de jardinage ou de bottes, un abri de jardin ou encore un local de piscine, etc...) », liste Guillaume Castagné.

Votre région, votre actu !

Recevez chaque jour les infos qui comptent pour vous.

S'inscrire

À lire aussi

Côtes-d’Armor : hospitalisé d’urgence après une piqûre de frelon

Détruire un nid doit se faire plus tôt dans la saison

Et au printemps suivant, c’est reparti. « La boucle est bouclée », poursuit-il. Les femelles repartent à proximité immédiate ou plus loin, en créant à chaque fois un nouveau nid.

Détruire un nid doit donc se faire plus tôt dans la saison. L'hiver, s'il n'y a pas d'activité, c'est inutile. Pour éviter tout risque de piqûre mais également pour éviter la naissance des femelles, et leur rencontre avec les mâles, il faut intervenir avant, insiste le spécialiste.

« Et il est même recommandé de **laisser les nids l'hiver** pour adapter l'équilibre alimentaire. Les spécialistes s'accordent à penser que l'on ne pourra pas éradiquer le frelon asiatique, mais avec le temps, certaines espèces d'oiseaux permettront d'équilibrer l'écosystème », estime Guillaume Castagné.

L'INPN (Inventaire national du patrimoine naturel) dresse une liste de précautions à prendre en cas de découverte d'un nid de frelons asiatiques, et ce, durant toutes les saisons :

- Avant tout travaux dans votre jardin, vérifiez qu'un nid n'est pas installé dans un buisson ou une haie. **Regardez notamment qu'il n'y ait pas un va-et-vient de frelons.**
- Un frelon isolé ne vous piquera pas si vous n'essayez pas de le tuer ou de le repousser brusquement. Sa réaction à votre contact sera généralement la fuite. Attention à ce qu'il ne se prenne pas dans vos vêtements ou cheveux.
- Respectez une distance de sécurité de cinq mètres du nid. Ne pas tenter de le détruire vous-même. Si vous avez dérangé la colonie et que des frelons volent autour de vous, ne fuyez pas, arrêtez de bouger et fermez les yeux si besoin. Ils se calmeront rapidement et vous pourrez vous éloigner calmement.

Que faire en cas de piqûre ?

- Si réaction allergique, appelez en urgence le 15. Les symptômes peuvent être de l'urticaire, rougeurs, démangeaisons, gonflement généralisés, œdème de la langue ou des voies respiratoires (pression thoracique, cyanose : une coloration bleutée de la peau), chute de tension,

vertiges, nausées, vomissements, diarrhée.

- Si piqûre dans la bouche, la gorge, piqûres multiples (plus de 20) ou si les symptômes locaux s'aggravent, consulter d'urgence un médecin.
- Les autres cas sont douloureux mais généralement sans gravité. Retirez vos bagues en cas de piqûre à la main, désinfectez à l'eau et au savon et éventuellement avec un antiseptique. Approcher une source de chaleur (sèche-cheveux, cigarette), en évitant de vous brûler, peut permettre de diminuer la douleur.

À lire aussi

Côtes-d'Armor : hospitalisé d'urgence après une piqûre de frelon

Surtout, si vous découvrez un nid chez vous, n'essayez pas de le détruire vous-même ! Il est recommandé d'essayer de suivre les insectes pour voir si leur nid n'est pas à proximité en respectant la **distance de sécurité de 5 mètres** et en faisant attention à ne pas faire de gestes brusques. Puis, vous pouvez signaler le nid à votre mairie ou directement à l'organisme animant la lutte contre cette espèce dans votre département.

L'État ne prend pas en charge les destructions des nids, tant qu'aucune méthode efficace de lutte n'est découverte. Un nid présentant un danger immédiat pourra être détruit par les pompiers. Les autres devront l'être par un désinsectiseur spécialisé. Certaines collectivités peuvent prendre en charge une partie ou la totalité de ses coûts.

Un argument financier aussi...

Autre raison de laisser ces nids se détruire naturellement l'hiver, un argument financier. Le [Journal de Vitré](#), près de Rennes (Ille-et-Vilaine), expliquait il y a quelques jours que « depuis le 25 novembre », toute intervention sollicitée directement auprès d'un prestataire ne sera plus

prise en charge par la collectivité et devra être acquittée par le demandeur.

À lire aussi

Bretagne Sud : une collecte de déchets sur une plage pour aider à fabriquer un filtre anti-frelon

Avec plus de 8 000 interventions sur les communes du département d'Ille-et-Vilaine depuis le début du mois d'avril, c'est un record historique qui vient d'être franchi au terme de cette saison 2022.

« Si de nombreux nids seront sans doute découverts dans les chênes en décembre à la chute des feuilles, d'un point de vue technique ou environnemental, il n'y aura plus de raison valable d'engager des dépenses publiques supplémentaires sur le traitement de ces nids », insiste la Fédération des groupements de défense contre les organismes nuisibles en Ille-et-Villaine (Fgdon 35).

Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec [Mon Actu](#).