LES OBSERVATOIRES CITOYENS DU PARC – GÉOPARC

LES CAUSSES
DU QUERCY



EN QUÊTE DES PAPILLONS EMBLÉMATIQUES DU LOT

Parc naturel régional des Causses du Quercy

unesco
Géoparc mondial

LES OBSERVATOIRES CITOYENS DU PARC – GÉOPARC, UN OUTIL PARTICIPATIF !

Le Parc naturel régional – Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy a pour mission de protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire. Pour l'accompagner et accroître ses connaissances, il fait appel aux citoyens.
En participant à cet observatoire, vous contribuez à la collecte de données et aidez à étudier l'état de la biodiversité de notre territoire.

COMMENT PARTICIPER ?

C'est très simple : lorsque vous observez l'une de ces espèces connectez-vous sur **www.parc-causses-du-quercy.fr/observatoires** et enregistrez votre observation !
Pas besoin d'être un expert : vous avez devant vos yeux l'outil nécessaire pour identifier cette espèce.
Accompagnées d'une **photo**, vos données seront plus facilement validées.

POURQUOI UNE ENQUÊTE SUR CES PAPILLONS DE JOUR ?

Une meilleure connaissance de la répartition de ces papillons permet de mettre en œuvre une gestion adaptée des milieux dans lesquels ils vivent, profitant également à une multitude d'autres espèces. Le suivi de ces populations sur le long terme constitue un outil important pour évaluer l'état des milieux naturels et l'efficacité des actions de conservation et de renaturation.

OÙ ET COMMENT LES OBSERVER ?

On peut repérer les papillons par la végétation. En effet, les papillons ont tous des **plantes préférentielles** appelées « **plantes hôtes** ». En les observant, elles nous donnent un indice de la présence potentielle du papillon.

L'Hermite *Chazara briseis*



Ce papillon de nuit discret, de teintes claires tachées de marron, est observé sur les pelouses sèches bien exposées au soleil, à végétation basse et éparse, souvent rocailleuses. Il est visible volant près du sol et se posant sur des pierres pour se camoufler. Il a pu être observé sur le causse de Gramat.

Envergure : 45 -71 mm

Plantes hôtes :

- Seslérie blanchâtre, Seslerie bleue
- Groupe des Fétuques
- Palingre, Brachypode rupestre

Périodes d'observations optimales

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
L'Hermite												

Forte probabilité d'observation — Observation probable

La Laineuse du Prunellier *Eriogaster catax:*



Souvent observée sous sa forme de chenille couverte de poils blancs, noirs et bruns, l'espèce fréquente les landes calcaires parsemées d'arbustes. Les groupes de chenilles y tissent un « nid » en avril et mai de soies blanches d'environ 15 centimètres qui est utilisé comme solarium. Aux derniers stades, elles se déplacent et se chrysalident au sol et au centre d'un fourré. Il en émerge un papillon que l'on voit voler en début de nuit au sein de ces milieux à faciès arbustifs.
Les deux sexes présentent des différences de couleurs avec un mâle orangé et une femelle plutôt brunâtre.

Envergure : Mâle 30 - 36 mm / Femelle 38 - 45 mm

Plantes hôtes :

- Arbustes de landes calcaires de type Aubépine, Prunellier

L'Aurore de Provence *Anthocharis euphenoides*



Ce papillon jaune aux pointes des ailes orange pour le mâle et blanchâtre pour la femelle est spécifique aux milieux méditerranéens. Il fréquente les prairies, pelouses et lisières. Les mâles, visibles au printemps, patrouillent à la recherche des femelles. Les œufs sont pondus sur des crucifères (brassicacées) sauvages dans des milieux plutôt secs comme sur le Quercy blanc.

Envergure : Mâle 30 - 36 mm / Femelle 38 - 45 mm

Plantes hôtes :

- Sisymbre officinal, Herbe aux chantres
- Biscutelle lisse, Lunetière lisse, Lunetière lisse

Le Cuivré des marais *Lycaena dispar*



Ce petit papillon aux ailes orangées, a le dessous des ailes orange vif, bordées de gris, ornées d'arcs de points noirs et avec à leur base des teintes bleutées. Il est typique des prairies humides, prairies de fauche de fond de vallées (vallées de l'Ouysse ou du Vers notamment).

Envergure : 35 - 40 mm

Plantes hôtes :

- Oseilles et Patiences types Oseille géante, Oseille
- Pulicaire commune
- Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau

Périodes d'observations optimales

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
La Laineuse du Prunellier												
L'Aurore de Provence												
Le Cuivré des marais												

Forte probabilité d'observation
Observation probable
Observation des chenilles

ATTENTION À NE PAS LES CONFONDRE !

Pour éviter toute confusion lors des observations, voici des espèces semblables à ces papillons et leurs critères distinctifs :





L'Hermite *(Chazara briseis)* peut être confondu avec d'autres grands saturinés comme le Silène *(Brintesia circe)*, qui est plus grand et présente des motifs plus contrastés.





La Laineuse du Prunellier *(Eriogaster catax)* peut être confondue avec d'autres espèces comme la Laineuse du Cerisier *(Eriogaster lanestris)*, mais cette dernière vole uniquement en hiver et au printemps.





L'Aurore de Provence *(Anthocharis euphenoides)* est proche de L'Aurore *(Anthocharis cardamines)* mais possède des ailes arrières d'un jaune bien plus vif.





Le Cuivré des marais *(Lycaena dispar)* se distingue par sa couleur éclatante orange lorsqu'il ouvre ses ailes.
Le Cuivré commun *(Lycaena phlaeas)* est plus petit et présente des taches noires sur le dessus des ailes.

Les quatre espèces de papillons sont classées en listes rouge des espèces menacées mondiale, française ou régionale.

La Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée
FRANCE NATION VERTE
FONDS VERT !
PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE
Liberté Égalité Fraternité
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Liberté Égalité Fraternité

Création : Caroline Tremesaygues - Impression : Champagnac - 06 / 2025

Ponte, les oeufs sont protégés par un manchon constitué de poils

chenille sur sa plante hôte, le prunellier (*Prunus spinosa*)

Vue de dessus

la chenille de la Laineuse du prunellier vit en nids communautaires

Vue de profil

Laineuse du prunellier

(*Eriogaster catax*)

taille réelle

Vue de dessus

Ponte

chenille sur sa plante hôte, l'oseille crépue (*Rumex crispus*)

taille réelle

Vue de dessus

Cuivré des marais (*Lycaena dispar*)

Vue de profil

Vue de dessus

taille réelle

Hermite (*Chazara briseis*)

Vue de profil

Vue de dessus

chenille sur sa plante hôte, la fétuque (*Festuca sp.*)

Vue de dessus

Vue de profil

Vue de dessus

chenille sur sa plante hôte, la lunetière lisse (*Biscutella laevigata*)

Vue de dessus

taille réelle

Aurore de Provence (*Anthocharis euphenoides*)

Elsa Bugot - 22.

© Elsa Bugot